

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA IZVAJANJE LAKTOZNEGA TESTA	Številka dokumenta:
Izdaja: 2.	Velja od: 01.07.2025		ND AM 05 Stran od strani: 1 od 3

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU




Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe
		Dodan opis za vrsto epruvete in komentarje k izvidu

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. ODGOVORNOST

3. IZVAJANJE

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Tina ŽURAN MILČNIK, spec.med.biokem. 	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem. 	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem. 

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA IZVAJANJE LAKTOZNEGA TESTA	Številka dokumenta:
Izdaja: 2.	Velja od: 01.07.2025		ND AM 05 Stran od strani: 2 od 3

TEHNIČNA NAVODILA ZA IZVAJANJE IZVAJANJE LAKTOZNEGA TESTA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Seznanitev zaposlenih na OLD, notranjih in zunanjih naročnikov ter pacientov z naročenim laktoznim testom z namenom pravilnega izvajanja laktoznega testa.

2. ODGOVORNOST

Vsi zaposleni na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča, notranji in zunanji naročniki laboratorijskih storitev in pacienti z naročenim laktoznim testom.

3. IZVAJANJE

Preiskovanec 3 dni pred testom uživa normalno hrano in je normalno telesno aktiven. Večji fizični napor pred testiranjem lahko vpliva na rezultate laktoznega testa. Pred opravljanjem laktoznega testa mora biti preiskovanec vsaj 12 ur tešč. Preiskovanec naj pride v laboratorij najpozneje do 8.00 ure.

Preiskovancu odvzamemo vensko kri na tešče v epruveto z Na-fluoridom (inhibitor glikolize), nato izvedemo obremenitev z laktozo – preiskovancu pripravimo raztopino 50 g laktoze, ki jo spiije najkasneje v 5 minutah.

Pri otrocih, ki lahko zaužijejo prilagojeno količino laktoze na osnovi njihove telesne teže se test izvaja na Otroškem oddelku SB Ptuj.

Preiskovancu se po 30-ih, 60-ih, 90-ih in 180-ih minutah ponovno odvzame kri, iz katere se določi koncentracija glukoze v plazmi. Med tem časom mora preiskovanec počivati v čakalnici, ne sme uživati hrane in ne sme kaditi. Preiskovanec sme med izvajanjem testa piti majhne količine vode. Po zadnjem odvzemu krvi je izvajanje testa za preiskovanca zaključeno.

Izmerjena vrednost glukoze v plazmi mora vsaj pri eni od meritev preseči vrednost, izmerjeno na tešče, in sicer za najmanj 1,4 mmol/L. Rezultate analize pošljemo naročniku.

V primeru, da preiskovanec izbljuva zaužito raztopino, o tem obvesti laboratorijskega delavca, ki izvedbo testa prekine. Izvid izdamo z ustreznim komentarjem: *Pacient/ka je med opravljanjem laktoznega testa bruhal/a, zato je bilo testiranje prekinjeno.*

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA IZVAJANJE LAKTOZNEGA TESTA	Številka dokumenta:
Izdaja: 2.	Velja od: 01.07.2025		ND AM 05 Stran od strani: 3 od 3

Referenčne vrednosti so opisane v dokumentu ZK 5.5_18 Seznam preiskav z orientacijskimi referenčnimi vrednostmi. Rezultate testa pošljemo naročniku.